EXPOSÉ

DES

TITRES SCIENTIFIQUES

DU

Docteur Eugène REGNAULD

Prosecteur à la Faculté de Médecine de Paris

PARIS

ASSELIN ET HOUZEAU

LA FACULTÉ DE MÉDICINE



TITRES SCIENTIFIQUES

Externe des Hopitaux	1880
Interne des Hôpitaux	1883
Aide d'Anatomie à la Faculté	1887
Prosceteur à la Faculté	1890
Docteur en Médecine	1891
Lauréat de la Faculté de Médecine	4801



TRAVAUX SCIENTIFIQUES

-

Gazette Médicale de 1882. — (Leçon recueillie dans le service de M. le Professeur Verneuil).

Coxalgie subaigüe depuis deux ans. — Contracture museulaire

intercurrente. — Aggravation subite et déformation simulant la luxation complète. — Chloroformisation, correction facile de l'attitude.

GAZETTE MÉDICALE de 1882. — (Leçon recueillie dans le service de M. le Professeur Verneuil).

Pseudo-coxalgie chez une vicille femme à la suite de fracture du grand trochanter. — Atrophie musculaire consécutive. Guérison par immobilisation et révulsion cutanée.

Gazette des Hôphaux, 1886. — (Leçon recueillie dans le service de M. le Professeur Tillaux).

Du diagnostic différentiel des tumeurs de la langue-

Gazette des Hôpitaux, 1886. — (Leçon recueillie dans le service de M. le Professore Tillaux)

M. le Professeur Tillaux).

Des caractères anatomiques et cliniques des fibromes utérins.

Bulletins de la Société Anatomique. — 1886. — Custite ainise Evéthrotomie interne. - Phénomènes d'intoxication prineppe -

Mort.

On trouve à l'autonsie une sonde incrustée de sels calcaires dans la vessie et dont la présence était ignorée du malade.

Bulletins de la Société Anatomique. - 1887.

Malade observée dans le service de M. le Professeur Le Dentu.

Corps fibreux utérin, très volumineux, avant déterminé des phénomènes d'infection. Intervention d'urgence. - Nécessité pour l'extraire d'y déterminer volontairement l'inversion de l'utérus. - Mort de la malade du choe. - Les manœuvres violentes nécessitées pour extraire le corps fibreux n'avaient point déterminé de lésions importantes.

Bulletins de la Société anatomique. - 1890.

Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine.

L'embryon, après avoir rompu la trompe, s'était enkysté dans le péritoine pelvien. Il existait en outre sur l'ovaire du même côté les traces d'une hémorragie enkystée abondante.

Thèse de doctorat. - 1891.

De l'intervention chirurgicale dans les grossesses extra-utérines. Dans ee travail basé sur l'étude des observations publiées à l'étran geret en France depuis la thèse d'agrégation de M. le docteur Maygrier, je suis arrivé aux conclusions suivantes :

- l'Les progrès de l'antisepsie et de l'outillage chirurgicalont permis dans ces dernières années de faire bénéficier la grossesse extrautérine de l'interventiou active;
- went la faire complètement abandonner:
- 3'Dès que le diagnostic de la grossesse est établi, il convient d'intervenir chirurgicalement à toutes les périodes avec ou sans complications, quel que soit l'état de vic ou de mort du fœtus. L'état de la mère doit toujours primer celui de l'enfant;
- 4° Si l'élythrotomie convient dans quelques circonstances particulières c'est à la laparotomie qu'il faut recourir dans l'immense maiorité des cas de grossesse extra-utérine;
- 5' Dans les complications aiguës ou chroniques de la grossesse extra-utérine, c'est toujours à la laparatomie qu'il faut avoir recours;
- 6° L'extraction du placenta est indispensable. L'ablation de la poche sera faite toutes les fois qu'il sera possible.

Bulletins de la Société de Biologie. — 1891.

Étude sur l'évolution de la prostate chez le chien. Conclusions de ce travail.

Cette ghande commence par de simples bourgeons épithéliaux pébrétaud dans un épuississement mésodermique. Ces tubes se renfient à leurs extrémités et sur leurs faces latérales, et donnent l'image d'une glande en grappe. Ces reullements poussent des prolongements en tous sens de telle sorte que la glande adulte oftre en dernier leu une forme aivetoiner rappelant la configuration des lèules pulmonnires. Chez le chien vieux, les faiseeaux musculiaires du stroma se multijiéent, le tissu conjonctif prend l'aspect fibreux. Ils semblent l'un et l'autre rétrécir et comprimer les cuisdesses giandulaires, tandis qu'à la missance le stromn l'emporte en masse sur les bourgeons épithéliaux et que chez le chien adulte le tissu épithélial constitue la plus grande partie de l'organe.

Journal de l'Anatomie. - 1891.

Étude sur l'évolution de la prostate chez le chien et chez l'homme.

J'ai d'abord exposé les faits communiqués à la Société de filologie sur la prostate du chien embryonanie, joune et adults. Pais profitant de nouveaux examens faits sur des sujets très igés, 14 aus et plus, Jai montré l'absence habitruelle de cales dans les cub-de-seas advéolaires et la diffusion habituelle aur toute la glande des modifications hypertrophiques qui se rencontrent toujours sur l'animal vieux.

Abordant ensuite la neine question chez Hoome, où j' zi ju me procurer quelques stades dans un titt de conservation partiale, j'il constaté que pendant la période embryomaine, la jounesse el'âge dadite, la prostate évolue chez Hoome comme chez le chien. Mais pendant la vieillesse il se produit chez l'houme des modifications periodes ches la processa pathologique intercurrent. Tundis que chez le chien, les culs-de-aser alvéolaires ne présentent que très rememente de acules, chez l'houme, a contraire, encue-de sont très fréquents. — En ayant soin d'examiner différentes régions de pravites chez l'houme, j' aiv que dans les points oil ut vicsite pas de calculs il y a hypertrophie simple de tous les éléments de la glande comme chen c chien, landis que dans les cul-sé-ases oi se sont formés des calculs, il y a atrophie et disparition de la carific glandalier de hypertrophie du stream. Mais ce sont il des lésions pathologiques qu'il ne fant pas confondre avec l'évolution normale de la galant.